

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription

PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 56

du 10 Mai 1985

VIGNE : Pas encore de taches primaires de mildiou, quelques foyers d'oïdium, vol de tordeuses de la grappe en diminution et toujours des acariens...

ARBRES FRUITIERS : Pousses oïdiées visibles, encore des pucerons et acariens...

CULTURES MARAICHERES : Risque de mildiou de la pomme de terre.

MAIS : Les noctuelles sont de retour...

VIGNE

- * **MILDIOU** : ne pas intervenir pour l'instant
 - Certaines mesures préventives sont efficaces pour retarder l'apparition du mildiou ex : suppression des sa-gattes au niveau du sol.
- * **OIDIUM** : Des foyers ont été observés sur Patrimonio et Aléria, en vignes mal protégées.
 - La plupart des produits sont curatifs si on réalise 2 traitements à 7 jours d'intervalle.
- * **Tordeuse de la grappe** : Le vol diminue dans tous nos postes de piégeage. Les pontes déposées sont pour l'instant peu nombreuses.
 - Attendre un prochain bulletin pour intervenir.
- * **Acariens** : Ils sont encore nombreux.
 - Effectuer un traitement acaricide dès maintenant si celui-ci n'a pas été réalisé.

Choisissez bien votre produit. N'oubliez pas que certains insecticides favorisent souvent les acariens (ex parathion, ainsi que d'autres matières actives : voir bulletin n° 54)

ARBRES FRUITIERS

- Les acariens et pucerons continuent à se développer dans les parcelles mal entretenues. Ne pas tarder pour intervenir.

.../... P12

- Dés tâches d'oïdium sont visibles sur pêchers. Maintenir la protection :

benomyl BENLATE
bupirimate NIMROD
dinocap..... KARATHANE
pyrazophos..... AFUGAN CE
soufre poudrage..... NS
triadimefon..... BAYLETON 5

binapacryl.....AMBOX 50
chinomethionate.... MORESTAN
fenarimol..... RUBIGAN
soufre mouillable.. NS
thiophanate methyl..PELT 44
triforineSAPROL DENARIN

CULTURES MARAICHÈRES

- Pomme de terre :

Une protection anti mildiou doit débuter dès maintenant. Les risques de contamination augmentent. Préférer pour l'instant un fongicide de contact. Renouveler la protection 7 à 10 jours après.

MAIS

Les dégâts de noctuelles ou vers gris sont déjà visibles sur Aléria (trous sur feuilles de maïs au stade plantule, collets des plantes sectionnés).



Larve de noctuelle
(ver gris)

- Surveillez vos jeunes plants. Vous pouvez traiter en **pulvérisation** (lutte délicate, conditions indispensables à la réussite : traiter au crépuscule avec au moins 800 l d'eau/ha)
Préférer les **appâts**.

Matière active	Pulvérisation		Appâts ou granulés	
	Produit commercial	Dose P.C./ ha	Produit commercial	Dose P.C.
Acéphate	Orthene 50	1,8 kg	Orthene 50	4,8 g/kg de son
Carbaryl			Sevin appât	30 kg/ha
Chlorpyrifos			Dursban appât	50 kg/ha
Cyperméthrine	Nombreux	30 g m.a./ha	Nombreux	30 g m.a./ 100 kg son et par ha
Deltaméthrine	Decis	0,3 l		
Endosulfan			Thiodan 35 CE	6 ml/kg de son
Endosulfan + Parathion			Drifène AP Ekadrine	8 ml/kg de son
Lindane			Nombreux : - pour les appâts au son - pour les appâts prêts à l'emploi	4 g m.a./kg de son 30 à 50 kg/ha
Permethrine	Ambush Perthrine	0,2 l	Ambush Perthrine	2 ml/kg de son
Phoxime			Volaton 5 G	75 kg/ha

Service de la Protection des Végétaux 1985 - Toute reproduction, même partielle est soumise à notre autorisation.